


Indicaties voor inzet Regionaal Consultatieteam Palliatieve Zorg



Omreken tabel opioïden 2016 ^I

MORFINE		FENTANYL	OXYCODON		HYDROMORFON		TRAMADOL	BUPRENORFINE	TAPENTADOL
oraal	s.c./i.v.	pleister	oraal	s.c./i.v.	oraal	s.c./i.v.	oraal	pleister	oraal
mg per 24 uur	mg per 24 uur	µg per uur	mg per 24 uur	mg per 24 uur	mg per 24 uur	mg per 24 uur	mg per 24 uur	µg per uur	mg per 24 uur
30	10	12	20	10		2	150	17,5 ^{II}	
60	20	25	40	20	12	4	300	35 ^{II}	150
120	40	50	80	40	24	8	- ^{III}	52,5	300
180	60	75	120	60	36	12	-	70 ^{II}	450
240	80	100	160	80	48	16	-	105	^V
360	120	150	240	120	72	24	-	140 ^{IV}	
480	160	200	320	160	96	32	-		

- I Bij het overgaan van het ene opioïd naar het andere (opioïdrotatie) wordt, ivm de te verwachten betere werking, geadviseerd om 75% van de equi-analgetische dosis te geven
- II de exacte equipotente doseringen zijn: buprenorfine 17,5 µg per uur ≈ 40 mg morfine, buprenorfine 35 µg per uur ≈ 80 mg morfine, buprenorfine 70 µg per uur ≈ 160 mg morfine, buprenorfine 140 µg per uur ≈ 320 mg morfine
- III De maximale dagdosering van tramadol is 400 mg/24 uur
- IV Hogere doseringen buprenorfine dan 140 µg per uur worden niet geadviseerd
- V De maximaal onderzochte dosis is 500 mg/dag. Over hogere doses kunnen geen uitspraken worden gedaan.